Acantholycosa norvegica Thor. beskrevs av Thorell efter exemplar från Norge. Ehuru arten tycks vara vanlig i fjälltrakterna, ha varken Westring eller Thorell erhållit svenska exemplar. Den är emellertid ganska svår att infånga i likhet med den andra svenska arten av släktet, vilket kanske förklarar att den ej förut noterats för Sverige. Oftast träffar man A. norvegica på klapperstensfält i björkskogsregionen, där den kan uppträda i stort antal på stenblocken.

I samlingen ingår även ett par exemplar av Acantholycosa lignaria (Cl.). Denna art, som såväl till utseende som levnadssätt i hög grad liknar den föregående, förekommer ganska allmänt i hela Sverige från Skåne till Lappland men går troligen aldrig över barrskogsgränsen.

Åke Holm.

Neuronia phalaenoides L. iakttagen i antal i övre Klarälvdalen.

Under en resa i Klarälvdalen sommaren 1933 sågo vi denna vår största och praktfullaste och därtill mycket sällsynta nattslända på följande platser vid älven:

9—10/6. Sandnäs (5 km. s. om Fastnäs). v. älvstranden, c:a 25 ex.
13/6. Vingäng 1 ex.
15/6. Långflon (två olika lokaler) 3 ex.

Om lokalens beskaffenhet och sländornas uppträdande vid Sandnäs må några korta meddelanden lämnas. — Älven framrinner, lugnt och i mäktiga serpentiner, i en djupt eroderad dalgång, som uppåt begränsas av skogklädda höjder. Närmare flodfåran utbreda sig tämligen plana åker- och ängsmarker, här och var med inslag av lövbuskar och spridda träd. Jordmånen är sandig. Stranden stupar brant mot älven, bildande 8—10 m. höga, av ren sand uppbyggda nipor, vilka äro nakna eller ställvis bevuxna med spridda tuvor av gräs och örter. I älven saknas vegetation fullständigt. — De första exemplaren av *Neuronia* observerades mot kvällen d. 9/6, som var en solig, lugn och varm dag. De flögo i branten mot älven och slogo till på vegetationen eller på den nakna marken alldeles invid vattenkanten. Innan djuren blivit skrämda, var deras flykt långsam och fladdrande; varsnade de fara, försökte de däremot med snabba kast rädda sig och gjorde därunder ofta långa flygturer ut över vattnet. Länge brukade det dock ej dröja, innan de återvände till nipan, som föreföll att vara deras älsklingstillhåll. Nästa förmiddag, då vädret fortfarande var vackert, uppträdde *Neuronia* på samma plats och i något större antal. Ett 10-tal ex. infångades medan ännu flera, som voro inom räckhåll för håven, lämnades i fred.

Motala och Omberg i maj 1934.

C. H. Lindroth. Th. Palm.